

## PARKİNSON YAŞLILARDA ALZHEİMER'DAN SONRA EN SIK GÖRÜLEN HASTALIK

**İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi Başkanı Prof. Dr. Murat Emre, Pfizer İlaçları tarafından düzenlenen Medya Bilgi Paylaşım Günleri toplantısında Türkiye'de 70.000-140.000 arasında Parkinson hastası olduğunu belirtti.**

**26.02.2004, İstanbul** – Pfizer İlaçları tarafından düzenlenen Medya Bilgi Paylaşım Günleri toplantılarının bu ayki konusu "Parkinson Hastalığı" oldu. İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi Başkanı Prof. Dr. Murat Emre konuyla ilgili bilgi ve görüşlerini basın mensupları ile paylaştı.

Prof. Dr. Murat Emre, Parkinson hastalığını, beynin belli bir bölgesinde meydana gelen hücre kaybının ardından "dopamin" maddesinin eksilmesiyle oluşan nörodejenaratif bir hastalık olarak tanımladı. Prof. Dr. Murat Emre, kişinin yaşam kalitesini de olumsuz yönde etkileyen Parkinson hastalığının ortaya çıkmasında, çevresel ve genetik faktörlerin rol oynadığına değindi.

Sebebi tam olarak bilinmemesine rağmen bazı faktörlerin Parkinson hastalığına yakalanma riskini artırdığına dikkat çeken Prof.Dr. Emre, genetik yatkınlığı olan, ciddi kafa travması geçiren veya kırsal bölgede yaşayan kişilerin de risk grubunda bulunduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Murat Emre, 65 yaşın üzerinde her 100 kişiden 1 kişide görülen Parkinson hastalığına yakalanma riskinin erkeklerde kadınlara oranla 2 kat daha fazla olduğunu ve hastalığın Türkiye'de 70.000-140.000 arasında kişiyi etkilediğini belirtti.

Parkinson hastalığı kol veya bacakların titremesi, kasların sertliği, vücut hareketlerinin yavaşlığı, denge kusuru, küçük adımlarla ve ayaklarını sürüyerek yürüme gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Temelde 5 evrede seyreden Parkinson hastalığının 1.evresinde belirtiler vücudun yalnızca bir yarısında görünürken, 2.evrede bu belirtiler her iki tarafta da görülüyor. Yavaş ilerleyen bir hastalık olan Parkinson'un 3.evresinde, denge bozuklukları ortaya çıkıyor ve bir sonraki evrede hasta günlük yaşamda desteğe ihtiyaç duyuyor. Hastalığın son evresinde ise hasta tam bağımlı hale gelebiliyor.

Parkinson hastalığının teşhisinin klinik olarak konulduğunu belirten Prof. Dr. Murat Emre, tam teşhis için toplam dört bulgudan ikisinin olması gerektiğini vurguladı. Prof. Emre, hastalığın bazen Parkinsonizmin diğer türleri ve "Esansiyel Tremor" (iyi huylu titreme) ile de karıştırılabileceğini söyledi.

Parkinson hastalığı için geliştirilmiş tedaviler olduğunu belirten Prof. Emre, bu tedavi tiplerinin fizyoterapi, ilaç tedavisi ve cerrahi tedavi olarak üçe ayrıldığını sözlerine ekledi.

*Pfizer, insanların daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesi amacı ile bilimsel araştırmalar yaparak yenilikçi sağlık ürünleri keşfeden, geliştiren ve 150 ülkede tıbbın hizmetine sunan bir kuruluştur. 1957 senesinden beri Türkiye'de üretim, tıbbi tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürütmekte olan Pfizer İlaçları, Türkiye'nin 3. en büyük ilaç ihracatçısıdır. 1000 kişiye istihdam sağlayan Pfizer İlaçları, 2001 ve 2002 senelerinde Capital Dergisi tarafından, 'Türk İlaç Sektörünün En Beğenilen Şirketi' seçilmiştir.*

### **Bilgi İçin :**

BG İletişim

(0212) 292 21 93 /info@bgiletisim.com