

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
DUPHASPASMIN*
Veteriner Enjeksiyonluk Çözelti
Tokolitik

BİLEŞİMİ

Duphaspasmin enjeksiyonluk çözelti, berrak, kokusuz, renksiz bir çözelti olup her ml'sinde 8.92 mg izoksuprine eşdeğer 11.58 mg izoksuprin laktat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Duphaspasmin enjeksiyonluk çözelti izoksuprin laktat içeren enjeksiyonluk bir çözüldür. İzoksuprin laktat bir β_2 -adrenerjik agonistir. Bileşimin β -mimetik özelliklerine bağlı olarak güçlü bir uterus relaksanı olduğu gösterilmiştir. Bu uterus gevşetici etkiye α -litik ve direk papaverin benzeri düz kas gevşetici özelliklerinin etkisi belirsizdir.

Diğer farmakolojik özellikleri β -mimetik, α -litik ve papaverin benzeri etkileri ile de açıklanabilir.

İzoksuprin hızla emilir, dağılır ve başlıca idrarla atılır. İlacın büyük bir kısmı uygulamadan sonraki ilk 24 saat içinde atılmaktadır.

Farmakokinetik çalışmalar izoksuprinin veya gastrointestinal sistemin düz kas hücrelerine herhangi belirgin bir etkisi yoktur, böylece

Büyükbaş hayvanlarda kalbin, akciğerlerin veya gastrointestinal sistemin düz kas hücrelerine herhangi belirgin bir etkisi yoktur, böylece ruminantlarda rumenin hareketlerinde herhangi bir bozukluğa neden olmaz.

Sıçanlarda ve farelerde yapılan çalışmalar izoksuprinin teratojenik ve mutajenik olmadığını göstermiştir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

DUPHASPASMIN genel olarak uterus kaslarının gevşemesi istenen sezaryen operasyonlarında, retensiyon sekondinarumda, prolapsus vagina ve prolapsus uteride, embriyotomide, pozisyon bozukluklarını düzeltmede, uterus spazmlarında, uterus ve serviks yırtıklarının dikilmesinde, geç abortları ve prematüre erken doğumları önlemede kullanılır.

DOZAJ VE UYGULAMA

Duphaspasmin enjeksiyonluk çözeltinin intramusküler uygulama için farmakolojik dozu tüm hayvan türleri için yaklaşık 0,5 mg izoksuprin laktat/kg canlı ağırlıktır. Gerekirse bu doz iki saatte bir tekrarlanabilir.

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde pratik olarak aşağıdaki dozlar kas içi uygulanır:

at ve inek:	20	ml/hayvan başına (~350 kg)
köpek :	0.4 -2	ml/hayvan başına (~7-35 kg)
kedi :	0.2	ml/hayvan başına (~3.5 kg)

Etki yaklaşık 10-15 dakikada başlar ve 1-2 saat devam eder. Gerekirse dozlar 2 saatte bir tekrarlanabilir.

Bir sezaryen operasyonundan önce ksilazin kullanılırsa aynı anda çift doz (40 ml) DUPHASPASMIN uygulanması tavsiye edilir.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER

Nadir olarak taşikardi ya da hafif kas titremeleri gözlemlenir, bu etkiler zararsız ve geçicidir. Uterus spazmolizisi oluşuktan hemen sonra bir oksitosin ajan (oksitosin gibi) uygulamak gerekebilir.

DiĞER İLAÇLARLA GEÇİMSİZLİĞİ

Trankilizan ya da anesteziklerin aynı zamanda uygulanması DUPHASPASMIN'in aktivitesini azaltır. Bu gibi durumlarda çift doz uygulanması tavsiye edilir.

Oksitosin ile aynı anda uygulama her iki ilacın etkisini baskılar.

Sempatomimetikler ve diğer vazodilatörlerle geçimsizdir.

DOZ AŞIMI VE ANTİDÖT

Doz aşımında taşikardi, hızlı solunum ve kas titremeleri oluşabilir, bunlar β -blokerler (propranolol) uygulandığında kaybolur.

GİDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Et ve süt için "0" gündür.

KONTRAENDİKASYONLARI

Akut hemorajik sendrom durumunda veya doğumu takiben kontrendikedir.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

Karanlık ve serin bir yerde (8°C-15°C) orijinal ambalajında saklayınız.

Raf ömrü imal tarihinden itibaren 36 aydır. Açıldıktan sonraki raf ömrü 28 gündür.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

20 ml ve 100ml.lik şeffaf cam flakonlarda/karton kutuda.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczaneler ve veteriner muayenehanelerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ:13.01.2010


TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI RUHSAT TARİH VE NO.: 01.03.2005 – 09/884

İMAL YERİ VE ADRESİ:

FORT DODGE VETERINARIA S.A.
Vall de Bianya (Girona)
İSPANYA

RUHSAT SAHİBİ VE ADRESİ:

PFİZER İLAÇLARI LTD.ŞTİ. 34347, ORTAKÖY, İSTANBUL



Beytullah OKAY
Bakan'a
Genel Müdür Yardımcısı

İç Ambalaj Etiketi

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
DUPHASPASMIN *
Veteriner Enjeksiyonluk Çözelti
Tokolitik

BİLEŞİMİ

Her ml.de 8.92 mg izoksuprine eşdeğer 11.58 mg izoksuprin laktat içeren berrak, kokusuz, renksiz çözelti.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

DUPHASPASMIN genel olarak uterus kaslarının gevşemesi istendiği durumlarda uygulanır.

DOZAJ VE UYGULAMA:

at ve inek:	20	ml/hayvan başına (~350 kg)
köpek :	0.4 -2	ml/hayvan başına (~7-35 kg)
kedi :	0.2	ml/hayvan başına (~3.5 kg)

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Et ve süt için"0" gündür.

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Karanlık ve serin bir yerde (8°C-15°C) orijinal ambalajında saklayınız.

Raf ömrü 36 aydır. Açıldıktan sonraki raf ömrü 28 gündür.

20 ml ve 100ml.lik şeffaf cam flakonlarda/karton kutuda.

Veteriner hekim reçetesi ile eczaneler ve veteriner muayenehanelerinde satılır (VHR).

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI RUHSAT TARİH VE NO.: 01.03.2005 – 09/884

İMAL YERİ VE ADRESİ:

FORT DODGE VETERINARIA S.A.
Vall de Bianya (Girona)
İSPANYA

RUHSAT SAHİBİ VE ADRESİ:

PFİZER İLAÇLARI LTD.ŞTİ. 34347. ORTAKÖY, İSTANBUL

Seri No:

İmal Tarihi:

Son Kull.Ta.:

Dış Ambalaj Etiketi

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
DUPHASPASMIN *
Veteriner Enjeksiyonluk Çözelti
Tokolitik

BİLEŞİMİ

Her ml.de 8.92 mg izoksuprine eşdeğer 11.58 mg izoksuprin laktat içeren berrak, kokusuz, renksiz çözelti.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

DUPHASPASMIN genel olarak uterus kaslarının gevşemesi istendiği durumlarda uygulanır.

DOZAJ VE UYGULAMA:

at ve inek:	20	ml/hayvan başına (~350 kg)
köpek :	0.4 -2	ml/hayvan başına (~7-35 kg)
kedi :	0.2	ml/hayvan başına (~3.5 kg)

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Et ve süt için"0" gündür.

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Karanlık ve serin bir yerde (8°C-15°C) orijinal ambalajında saklayınız.

Raf ömrü 36 aydır. Açıldıktan sonraki raf ömrü 28 gündür.

20 ml ve 100ml.lik şeffaf cam flakonlarda/karton kutuda.

Veteriner hekim reçetesi ile eczaneler ve veteriner muayenehanelerinde satılır (VHR).

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI RUHSAT TARİH VE NO.:

İMAL YERİ VE ADRESİ:

FORT DODGE VETERINARIA S.A.
Vall de Bianya (Girona)
İSPANYA

RUHSAT SAHİBİ VE ADRESİ:

PFİZER İLAÇLARI LTD.ŞTİ. 34347. ORTAKÖY, İSTANBUL

Seri No:

İmal Tarihi:

Son Kull.Ta.:

KDV dahil Türkiye'de perakende satış fiyatı:



Beytullah OKAY
Bakan a
Genel Müdür Yardımcısı